



UKŁAD ODDECHOWY

Badanie podmiotowe

Zestawienie elementów wywiadu uzyskiwanego od pacjentów z podejrzeniem choroby zawodowej układu oddechowego.

I. Dane pacjenta
A. Nazwisko, imię, adres B. Dane osobowe – wiek, płeć, rasa C. Wykształcenie, w tym szczegółowe dane o przebiegu kształcenia zawodowego z uwzględnieniem ekspozycji na czynniki szkodliwe
II. Wywiad zawodowy i środowiskowy
A. Obecne miejsce pracy, okres zatrudnienia B. Charakterystyka narażenia zawodowego – rodzaj czynników szkodliwych i intensywność narażenia (stężenia alergenów, pyłu, czynników drażniących i toksycznych), droga ekspozycji (wziewna, skórna) C. Stosowanie ochron osobistych D. Poprzednie miejsca pracy, ze szczegółową charakterystyką narażenia zawodowego
III. Historia choroby układu oddechowego
A. Rodzaj objawów: <ul style="list-style-type: none">• kaszel, duszność, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, "gra" w piersiach, „krótki” oddech• wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd oczu• objawy ogólne, gorączka, bóle stawowe i mięśniowe B. Czas trwania objawów C. Długość czasu zatrudnienia do wystąpienia objawów D. Tzw. "wzór" objawów <ul style="list-style-type: none">• natychmiastowe wystąpienie objawów po rozpoczęciu pracy, z szybką poprawą po powrocie do domu• wystąpienie objawów w 4-12 godz. po rozpoczęciu pracy lub po powrocie do domu• natychmiastowe wystąpienie objawów po rozpoczęciu pracy, z szybką poprawą w ciągu 4-12 godz. E. Okoliczności występowania objawów i pogarszania przebiegu choroby, związek pomiędzy narażeniem zawodowym a zaostrzeniami F. Przebieg i nasilenie/stopień zaawansowania choroby układu oddechowego G. Poprawa w czasie dni wolnych od pracy



IV. Wywiad medyczny nt. przebytych chorób i identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka

- A. Przebyte w przeszłości choroby, w tym astma, atopowe zapalenie skóry w dzieciństwie
- B. Objawy ze strony układu oddechowego w okresie poprzedzającym obecne narażenie
- C. Atopia
 - objawy sezonowego nieżytu nosa lub spojówek
 - rodzinny wywiad atopowy
 - dodatkowo wyniki testów skórnych wykonywanych w przeszłości
- D. Palenie tytoniu obecnie i w przeszłości, liczba "paczko-lat"

W przypadku podejrzenia:

- astmy zawodowej – ankieta 6A;
- alergii związanej z pracą – ankieta 6B;
- POCHP – ankieta 6C.

Uwagi

Podczas wykonywania badań kontrolnych u pracowników, u których orzeczono czasową niezdolność do pracy z powodu choroby na czas co najmniej 30 dni, powinno się zwrócić uwagę, czy przebyta choroba nie została np. mylnie rozpoznana jako ostre zapalenie oskrzeli, podczas gdy w rzeczywistości jest to zaostrzenie astmy oskrzelowej.

Istotne może być również, czy u pacjenta, powracającego do pracy po infekcji wirusowej, nie utrzymuje się nadreaktywność oskrzeli, która może być powodem dolegliwości w kontakcie z czynnikami drażniącymi obecnymi w środowisku pracy.

opracowały: dr hab. med. Marta Wiszniewska, prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa